■死亡率(重症度別)【第2四半期】

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージO	0.0	0	9
H 27/12/12/12/13	ステージ I	1.5	2	135
	ステージⅡ	5.5	3	55
	ステージ皿	1.6	1	62
	ステージⅣ	13.9	14	101
	不明	17.9	54	302
	全体	11.1	74	664
結腸の悪性新生物	ステージO	0.0	0	30
	ステージ Ι	1.3	1	75
	ステージⅡ	0.8	1	131
	ステージ皿	3.7	6	163
	ステージIV	13.3	24	180
	<u>ス) ブ</u> 不明	9.8	41	418
	全体	7.3	73	997
	ステージO			
直腸の悪性新生物	ステージ I	0.0	0	5 38
		0.0	0	
	ステージⅡ	2.6	1	38
	ステージⅢ	1.6	2	122
	ステージIV	8.4	9	107
	不明	10.6	21	199
	全体	6.5	33	509
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	3
	ステージ I	3.8	2	52
	ステージェ	8.3	3	36
	ステージ皿	7.9	5	63
	ステージⅣ	16.3	31	190
	不明	22.7	110	484
	全体	18.2	151	828
急性心筋梗塞	Killip I	3.4	5	149
	Killip II	4.7	3	64
	KillipⅢ	31.6	6	19
	Killip ™	50.0	30	60
	不明	57.1	16	28
	全体	18.8	60	320
肺炎	軽症	5.3	22	418
	中等症	11.2	21	188
	重症	17.6	109	620
	不明	0.0	0	20
	全体	12.2	152	1246
喘息	重症度の指標なし	1.7	2	120
	全体	1.7	2	120
脳梗塞	JCS 0-1	1.2	21	1748
	JCS 2-3	6.5	35	539
	JCS 10-100	12.2	22	180
	JCS 200-300	44.2	23	52
	不明	N/A	0	0
	全体	4.0	101	2519
脳出血	JCS 0-1	1.4	5	363
	JCS 2-3	8.7	15	173
	JCS 10-100	11.3	16	142
	JCS 200-300	58.4	59	101
	不明	N/A	0	0
	全体	12.2	95	779
糖尿病	重症度の指標なし	1.4	8	571
	全体	1.4	8	571
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	1.0	6	602
	全体	1.0	6	602
胃潰瘍	重症度の指標なし	1.5	2	136
	全体	1.5	2	136
急性腸炎	 	0.2	1	536
	全体	0.2	1	536
	工件	0.2	I	J30

■死亡率(重症度別)【第2四半期】

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.0	0	573
	全体	0.0	0	573
胆石症	重症度の指標なし	1.1	13	1133
	全体	1.1	13	1133
前立腺肥大症	重症度の指標なし	0.0	0	166
	全体	0.0	0	166
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	1348
	全体	0.0	0	1348
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	100
	全体	0.0	0	100
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	190
	全体	0.0	0	190
狭心症	重症度の指標なし	0.3	4	1416
	全体	0.3	4	1416
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.0	0	562
	全体	0.0	0	562
乳房の悪性新生物	ステージO	0.0	0	8
	ステージ I	0.0	0	110
	ステージⅡ	0.7	1	135
	ステージ皿	0.0	0	34
	ステージⅣ	8.7	2	23
	不明	12.7	15	118
	全体	4.2	18	42 8
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	433
	全体	0.0	0	433
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.0	0	658
	全体	0.0	0	658