

■死亡率(重症度別)【第3四半期】

H26/07/18

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージⅠ	0.9	2	235
	ステージⅡ	1.5	1	65
	ステージⅢ	0.0	0	60
	ステージⅣ	16.1	45	279
	不明	11.1	46	416
	全体	8.9	94	1055
結腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	41
	ステージⅠ	0.9	1	117
	ステージⅡ	1.9	2	107
	ステージⅢ	1.2	2	168
	ステージⅣ	7.6	16	210
	不明	5.9	22	371
	全体	4.2	43	1014
直腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	18
	ステージⅠ	0.0	0	60
	ステージⅡ	1.5	1	65
	ステージⅢ	0.9	1	117
	ステージⅣ	7.4	7	95
	不明	6.6	12	183
	全体	3.9	21	538
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	N/A	0	0
	ステージⅠ	2.3	3	130
	ステージⅡ	1.9	1	54
	ステージⅢ	9.0	14	155
	ステージⅣ	14.4	47	326
	不明	11.1	61	549
	全体	10.4	126	1214
急性心筋梗塞	KillipⅠ	3.1	4	127
	KillipⅡ	1.2	1	83
	KillipⅢ	25.9	7	27
	KillipⅣ	47.6	20	42
	不明	56.5	13	23
	全体	14.9	45	302
肺炎	軽症	2.4	12	492
	中等症	12.0	18	150
	重症	17.6	135	766
	不明	0.3	2	620
	全体	8.2	167	2028
喘息	重症度の指標なし	0.4	3	758
	不明	N/A	0	0
	全体	0.4	3	758
脳梗塞	JCS 0-1	1.8	13	735
	JCS 2-3	10.1	18	179
	JCS 10-100	32.0	24	75
	JCS 200-300	57.1	16	28
	不明	6.5	2	31
	全体	7.0	73	1048
脳出血	JCS 0-1	2.7	4	150
	JCS 2-3	10.0	7	70
	JCS 10-100	16.1	10	62
	JCS 200-300	65.1	54	83
	不明	46.2	6	13
	全体	21.4	81	378
糖尿病	重症度の指標なし	0.6	4	682
	全体	0.6	4	682
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	1.9	9	470
	全体	1.9	9	470
胃潰瘍	重症度の指標なし	1.6	3	185
	全体	1.6	3	185
急性腸炎	重症度の指標なし	0.3	2	695
	全体	0.3	2	695

■ 死亡率(重症度別)【第3四半期】

H26/07/18

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.0	0	493
	全体	0.0	0	493
胆石症	重症度の指標なし	0.8	9	1148
	全体	0.8	9	1148
前立腺肥大症	重症度の指標なし	1.2	2	167
	全体	1.2	2	167
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	1316
	全体	0.0	0	1316
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	111
	全体	0.0	0	111
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	313
	全体	0.0	0	313
狭心症	重症度の指標なし	0.2	3	1785
	全体	0.2	3	1785
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.0	0	418
	全体	0.0	0	418
乳房の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	13
	ステージⅠ	0.0	0	6
	ステージⅡ	0.0	0	118
	ステージⅢ	0.0	0	25
	ステージⅣ	10.4	5	48
	不明	6.8	14	205
	全体	4.6	19	415
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	296
	全体	0.0	0	296
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.2	1	658
	全体	0.2	1	658