

■死亡率(重症度別)【第4四半期】

H27/08/07

| | | 死亡率(%) | 死亡症例数(人) | 症例数(人) |
|---------------|-------------|--------|----------|--------|
| 胃の悪性新生物 | ステージⅠ | 0.5 | 1 | 195 |
| | ステージⅡ | 2.3 | 1 | 43 |
| | ステージⅢ | 21.9 | 7 | 32 |
| | ステージⅣ | 16.1 | 33 | 205 |
| | 不明 | 9.1 | 26 | 285 |
| | 全体 | 8.9 | 68 | 760 |
| 結腸の悪性新生物 | ステージ0 | 0.0 | 0 | 30 |
| | ステージⅠ | 0.0 | 0 | 91 |
| | ステージⅡ | 2.0 | 2 | 101 |
| | ステージⅢ | 2.1 | 3 | 143 |
| | ステージⅣ | 11.2 | 21 | 188 |
| | 不明 | 8.7 | 20 | 229 |
| | 全体 | 5.9 | 46 | 782 |
| 直腸の悪性新生物 | ステージ0 | 0.0 | 0 | 13 |
| | ステージⅠ | 1.3 | 1 | 77 |
| | ステージⅡ | 9.1 | 5 | 55 |
| | ステージⅢ | 0.0 | 0 | 85 |
| | ステージⅣ | 9.4 | 9 | 96 |
| | 不明 | 7.9 | 10 | 126 |
| | 全体 | 5.5 | 25 | 452 |
| 気管支および肺の悪性新生物 | ステージ0 | 0.0 | 0 | 2 |
| | ステージⅠ | 4.9 | 3 | 61 |
| | ステージⅡ | 0.0 | 0 | 27 |
| | ステージⅢ | 7.8 | 8 | 102 |
| | ステージⅣ | 23.5 | 59 | 251 |
| | 不明 | 16.9 | 62 | 367 |
| | 全体 | 16.3 | 132 | 810 |
| 急性心筋梗塞 | KillipⅠ | 1.6 | 2 | 126 |
| | KillipⅡ | 6.1 | 4 | 66 |
| | KillipⅢ | 35.7 | 5 | 14 |
| | KillipⅣ | 36.7 | 11 | 30 |
| | 不明 | 63.2 | 12 | 19 |
| | 全体 | 13.3 | 34 | 255 |
| 肺炎 | 軽症 | 2.8 | 17 | 603 |
| | 中等症 | 4.5 | 11 | 242 |
| | 重症 | 17.5 | 194 | 1108 |
| | 不明 | 0.0 | 0 | 620 |
| | 全体 | 8.6 | 222 | 2573 |
| 喘息 | 重症度の指標なし | 0.5 | 2 | 420 |
| | 不明 | N/A | 0 | 0 |
| | 全体 | 0.5 | 2 | 420 |
| 脳梗塞 | JCS 0-1 | 1.6 | 9 | 579 |
| | JCS 2-3 | 6.4 | 11 | 171 |
| | JCS 10-100 | 15.1 | 11 | 73 |
| | JCS 200-300 | 40.7 | 11 | 27 |
| | 不明 | 23.1 | 3 | 13 |
| | 全体 | 5.2 | 45 | 863 |
| 脳出血 | JCS 0-1 | 1.9 | 3 | 154 |
| | JCS 2-3 | 3.0 | 3 | 99 |
| | JCS 10-100 | 18.4 | 14 | 76 |
| | JCS 200-300 | 64.6 | 42 | 65 |
| | 不明 | 27.3 | 3 | 11 |
| | 全体 | 16.0 | 65 | 405 |
| 糖尿病 | 重症度の指標なし | 1.3 | 8 | 638 |
| | 全体 | 1.3 | 8 | 638 |
| 大腿骨頸部骨折 | 重症度の指標なし | 0.9 | 4 | 460 |
| | 全体 | 0.9 | 4 | 460 |
| 胃潰瘍 | 重症度の指標なし | 1.3 | 2 | 150 |
| | 全体 | 1.3 | 2 | 150 |
| 急性腸炎 | 重症度の指標なし | 0.3 | 2 | 572 |
| | 全体 | 0.3 | 2 | 572 |

■ 死亡率(重症度別)【第4四半期】

H27/08/07

| | | 死亡率(%) | 死亡症例数(人) | 症例数(人) |
|-----------|----------|--------|----------|--------|
| 急性虫垂炎 | 重症度の指標なし | 0.0 | 0 | 308 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 308 |
| 胆石症 | 重症度の指標なし | 0.9 | 7 | 810 |
| | 全体 | 0.9 | 7 | 810 |
| 前立腺肥大症 | 重症度の指標なし | 0.0 | 0 | 96 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 96 |
| 白内障 | 重症度の指標なし | 0.0 | 0 | 1282 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 1282 |
| 痔核 | 重症度の指標なし | 0.0 | 0 | 52 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 52 |
| 子宮筋腫 | 重症度の指標なし | 0.0 | 0 | 205 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 205 |
| 狭心症 | 重症度の指標なし | 0.4 | 7 | 1734 |
| | 全体 | 0.4 | 7 | 1734 |
| 腎結石及び尿管結石 | 重症度の指標なし | 0.0 | 0 | 345 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 345 |
| 乳房の悪性新生物 | ステージ0 | 0.0 | 0 | 6 |
| | ステージⅠ | 0.0 | 0 | 1 |
| | ステージⅡ | 0.8 | 1 | 119 |
| | ステージⅢ | 0.0 | 0 | 11 |
| | ステージⅣ | 8.7 | 2 | 23 |
| | 不明 | 10.1 | 18 | 179 |
| | 全体 | 6.2 | 21 | 339 |
| 膝関節症 | 重症度の指標なし | 0.0 | 0 | 169 |
| | 全体 | 0.0 | 0 | 169 |
| 鼠径ヘルニア | 重症度の指標なし | 0.2 | 1 | 561 |
| | 全体 | 0.2 | 1 | 561 |