

■死亡率(重症度別)【第1四半期】

H27/08/07

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージⅠ	1.0	2	209
	ステージⅡ	0.0	0	66
	ステージⅢ	4.8	3	62
	ステージⅣ	18.2	43	236
	不明	9.9	34	344
	全体	8.9	82	917
結腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	44
	ステージⅠ	2.3	2	86
	ステージⅡ	0.7	1	153
	ステージⅢ	3.1	4	128
	ステージⅣ	8.6	19	220
	不明	10.6	30	283
	全体	6.1	56	914
直腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	15
	ステージⅠ	0.0	0	62
	ステージⅡ	0.0	0	37
	ステージⅢ	3.9	4	102
	ステージⅣ	9.1	9	99
	不明	11.4	16	140
	全体	6.4	29	455
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	2
	ステージⅠ	3.6	3	83
	ステージⅡ	4.9	2	41
	ステージⅢ	12.2	18	147
	ステージⅣ	18.8	62	330
	不明	10.5	56	534
	全体	12.4	141	1137
急性心筋梗塞	KillipⅠ	2.4	3	125
	KillipⅡ	5.5	3	55
	KillipⅢ	15.0	3	20
	KillipⅣ	50.0	20	40
	不明	62.5	20	32
	全体	18.0	49	272
肺炎	軽症	2.2	11	494
	中等症	8.3	15	181
	重症	15.0	146	971
	不明	0.3	2	766
	全体	7.2	174	2412
喘息	重症度の指標なし	0.2	1	537
	不明	N/A	0	0
	全体	0.2	1	537
脳梗塞	JCS 0-1	3.9	28	714
	JCS 2-3	3.3	7	209
	JCS 10-100	23.1	24	104
	JCS 200-300	31.3	10	32
	不明	9.1	2	22
	全体	6.6	71	1081
脳出血	JCS 0-1	1.8	3	170
	JCS 2-3	8.3	6	72
	JCS 10-100	14.0	12	86
	JCS 200-300	75.0	57	76
	不明	25.0	4	16
	全体	19.5	82	420
糖尿病	重症度の指標なし	0.9	7	768
	全体	0.9	7	768
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	1.1	5	454
	全体	1.1	5	454
胃潰瘍	重症度の指標なし	0.0	0	174
	全体	0.0	0	174
急性腸炎	重症度の指標なし	0.1	1	834
	全体	0.1	1	834

■ 死亡率(重症度別)【第1四半期】

H27/08/07

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.4	2	494
	全体	0.4	2	494
胆石症	重症度の指標なし	0.7	7	1023
	全体	0.7	7	1023
前立腺肥大症	重症度の指標なし	0.0	0	92
	全体	0.0	0	92
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	1451
	全体	0.0	0	1451
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	79
	全体	0.0	0	79
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	300
	全体	0.0	0	300
狭心症	重症度の指標なし	0.2	3	1551
	全体	0.2	3	1551
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.0	0	357
	全体	0.0	0	357
乳房の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	7
	ステージⅠ	0.0	0	5
	ステージⅡ	0.0	0	144
	ステージⅢ	0.0	0	20
	ステージⅣ	13.6	3	22
	不明	4.2	9	215
	全体	2.9	12	413
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	249
	全体	0.0	0	249
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.2	1	650
	全体	0.2	1	650