

■死亡率(重症度別)【第3四半期】

H27/08/07

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージⅠ	0.4	1	239
	ステージⅡ	6.3	4	63
	ステージⅢ	4.3	2	47
	ステージⅣ	12.4	33	267
	不明	11.6	41	352
	全体	8.4	81	968
結腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	38
	ステージⅠ	0.0	0	105
	ステージⅡ	0.7	1	142
	ステージⅢ	0.0	0	141
	ステージⅣ	11.5	25	217
	不明	6.1	16	264
	全体	4.6	42	907
直腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	24
	ステージⅠ	0.0	0	61
	ステージⅡ	1.9	1	54
	ステージⅢ	0.0	0	119
	ステージⅣ	9.4	11	117
	不明	9.7	14	144
	全体	5.0	26	519
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	2
	ステージⅠ	2.7	2	73
	ステージⅡ	5.8	3	52
	ステージⅢ	10.1	14	138
	ステージⅣ	14.5	42	290
	不明	12.6	64	508
	全体	11.8	125	1063
急性心筋梗塞	KillipⅠ	0.7	1	138
	KillipⅡ	3.6	3	83
	KillipⅢ	7.1	2	28
	KillipⅣ	43.1	22	51
	不明	52.2	12	23
	全体	12.4	40	323
肺炎	軽症	2.3	11	481
	中等症	10.0	19	190
	重症	15.1	133	881
	不明	0.4	3	718
	全体	7.3	166	2270
喘息	重症度の指標なし	0.2	1	637
	不明	N/A	0	0
	全体	0.2	1	637
脳梗塞	JCS 0-1	2.0	13	663
	JCS 2-3	5.0	9	179
	JCS 10-100	18.2	16	88
	JCS 200-300	51.5	17	33
	不明	23.5	4	17
	全体	6.0	59	980
脳出血	JCS 0-1	3.5	6	172
	JCS 2-3	4.5	3	67
	JCS 10-100	13.2	9	68
	JCS 200-300	69.8	60	86
	不明	27.3	3	11
	全体	20.0	81	404
糖尿病	重症度の指標なし	1.0	6	614
	全体	1.0	6	614
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	1.2	6	502
	全体	1.2	6	502
胃潰瘍	重症度の指標なし	1.0	2	203
	全体	1.0	2	203
急性腸炎	重症度の指標なし	0.5	3	609
	全体	0.5	3	609

■ 死亡率(重症度別)【第3四半期】

H27/08/07

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.0	0	416
	全体	0.0	0	416
胆石症	重症度の指標なし	0.5	6	1135
	全体	0.5	6	1135
前立腺肥大症	重症度の指標なし	0.0	0	146
	全体	0.0	0	146
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	1396
	全体	0.0	0	1396
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	73
	全体	0.0	0	73
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	293
	全体	0.0	0	293
狭心症	重症度の指標なし	0.2	3	1857
	全体	0.2	3	1857
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.0	0	451
	全体	0.0	0	451
乳房の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	14
	ステージⅠ	0.0	0	3
	ステージⅡ	0.6	1	160
	ステージⅢ	0.0	0	19
	ステージⅣ	3.2	1	31
	不明	7.1	15	211
	全体	3.9	17	438
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	235
	全体	0.0	0	235
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.0	0	610
	全体	0.0	0	610