

# ■死亡率(重症度別)【第4四半期】

H29/06/27

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	9
	ステージI	1.4	2	144
	ステージII	3.0	1	33
	ステージIII	22.2	6	27
	ステージIV	21.1	20	95
	不明	14.6	41	280
	全体	11.9	70	588
結腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	17
	ステージI	0.0	0	81
	ステージII	1.1	1	91
	ステージIII	5.2	8	154
	ステージIV	7.8	12	154
	不明	7.5	22	293
	全体	5.4	43	790
直腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	10
	ステージI	3.2	1	31
	ステージII	0.0	0	49
	ステージIII	5.0	3	60
	ステージIV	5.2	5	97
	不明	7.4	12	162
	全体	5.1	21	409
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	3
	ステージI	2.8	1	36
	ステージII	0.0	0	14
	ステージIII	7.1	5	70
	ステージIV	25.2	34	135
	不明	12.8	46	358
	全体	14.0	86	616
急性心筋梗塞	Killip I	6.7	7	104
	Killip II	3.3	2	60
	Killip III	17.4	4	23
	Killip IV	57.5	23	40
	不明	66.7	12	18
	全体	19.6	48	245
肺炎	軽症	3.6	21	578
	中等症	8.3	21	252
	重症	13.2	137	1037
	不明	0.0	0	413
	全体	7.9	179	2280
喘息	重症度の指標なし	0.3	1	318
	不明	N/A	0	0
	全体	0.3	1	318
脳梗塞	JCS 0-1	1.8	9	487
	JCS 2-3	9.5	17	179
	JCS 10-100	25.4	18	71
	JCS 200-300	52.6	10	19
	不明	0.0	0	8
	全体	7.1	54	764
脳出血	JCS 0-1	5.0	5	100
	JCS 2-3	5.2	3	58
	JCS 10-100	12.5	8	64
	JCS 200-300	59.0	23	39
	不明	16.7	1	6
	全体	15.0	40	267
糖尿病	重症度の指標なし	0.6	3	468
	全体	0.6	3	468
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	1.9	7	359
	全体	1.9	7	359
胃潰瘍	重症度の指標なし	0.0	0	90
	全体	0.0	0	90
急性腸炎	重症度の指標なし	1.0	5	506

# ■死亡率(重症度別)【第4四半期】

H29/06/27

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
	全体	1.0	5	506
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.0	0	266
	全体	0.0	0	266
胆石症	重症度の指標なし	0.3	2	723
	全体	0.3	2	723
前立腺肥大症	重症度の指標なし	0.0	0	78
	全体	0.0	0	78
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	1043
	全体	0.0	0	1043
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	74
	全体	0.0	0	74
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	163
	全体	0.0	0	163
狭心症	重症度の指標なし	0.0	0	1148
	全体	0.0	0	1148
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.0	0	210
	全体	0.0	0	210
乳房の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	11
	ステージI	0.0	0	51
	ステージII	1.5	1	67
	ステージIII	6.7	1	15
	ステージIV	0.0	0	25
	不明	4.7	9	190
	全体	3.1	11	359
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	144
	全体	0.0	0	144
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.0	0	407
	全体	0.0	0	407