

■ 医療費(重症度別)【第2四半期】

H29/02/07

| | | 医療費 | | 症例数 |
|---------------|-------------|-----------|---------|------|
| | | 1入院費用(円) | 1日単価(円) | (人) |
| 胃の悪性新生物 | ステージ0 | 459,647 | 53,036 | 6 |
| | ステージI | 1,076,550 | 69,976 | 156 |
| | ステージII | 1,493,938 | 83,319 | 43 |
| | ステージIII | 1,322,167 | 64,665 | 56 |
| | ステージIV | 1,036,438 | 51,758 | 161 |
| | 不明 | 844,827 | 56,745 | 250 |
| | 全体 | 1,022,401 | 60,726 | 672 |
| 結腸の悪性新生物 | ステージ0 | 617,029 | 69,999 | 27 |
| | ステージI | 1,066,804 | 76,330 | 84 |
| | ステージII | 1,270,216 | 70,839 | 116 |
| | ステージIII | 849,590 | 70,617 | 129 |
| | ステージIV | 754,033 | 63,650 | 215 |
| | 不明 | 683,362 | 63,197 | 273 |
| | 全体 | 843,470 | 67,522 | 844 |
| 直腸の悪性新生物 | ステージ0 | 801,674 | 73,487 | 11 |
| | ステージI | 1,101,981 | 75,302 | 41 |
| | ステージII | 1,439,035 | 72,575 | 64 |
| | ステージIII | 1,217,637 | 68,100 | 75 |
| | ステージIV | 683,913 | 69,406 | 171 |
| | 不明 | 677,633 | 63,948 | 181 |
| | 全体 | 878,492 | 68,804 | 543 |
| 気管支および肺の悪性新生物 | ステージ0 | N/A | N/A | 0 |
| | ステージI | 1,515,493 | 115,384 | 67 |
| | ステージII | 1,157,716 | 67,879 | 18 |
| | ステージIII | 948,797 | 48,096 | 44 |
| | ステージIV | 1,050,333 | 51,295 | 170 |
| | 不明 | 658,904 | 57,664 | 354 |
| | 全体 | 881,980 | 60,112 | 653 |
| 急性心筋梗塞 | Killip I | 1,666,667 | 132,212 | 132 |
| | Killip II | 2,031,077 | 114,209 | 37 |
| | Killip III | 2,319,190 | 98,528 | 13 |
| | Killip IV | 2,068,671 | 137,416 | 37 |
| | 不明 | 902,164 | 82,641 | 12 |
| | 全体 | 1,786,434 | 124,447 | 231 |
| 肺炎 | 軽症 | 488,193 | 39,681 | 459 |
| | 中等症 | 658,047 | 41,017 | 185 |
| | 重症 | 871,855 | 43,157 | 748 |
| | 不明 | 269,995 | 44,537 | 498 |
| | 全体 | 599,166 | 42,342 | 1890 |
| 喘息 | 重症度の指標なし | 327,287 | 39,545 | 286 |
| | 不明 | N/A | N/A | 0 |
| | 全体 | 327,287 | 39,545 | 286 |
| 脳梗塞 | JCS 0-1 | 1,319,277 | 68,355 | 506 |
| | JCS 2-3 | 1,897,560 | 65,161 | 165 |
| | JCS 10-100 | 1,882,231 | 70,584 | 69 |
| | JCS 200-300 | 1,559,398 | 57,309 | 19 |
| | 不明 | 1,433,161 | 54,750 | 17 |
| | 全体 | 1,500,667 | 67,030 | 776 |
| 脳出血 | JCS 0-1 | 1,956,945 | 84,102 | 93 |
| | JCS 2-3 | 2,800,077 | 79,871 | 52 |
| | JCS 10-100 | 2,848,930 | 73,796 | 38 |
| | JCS 200-300 | 1,670,030 | 69,333 | 46 |
| | 不明 | 1,811,657 | 59,399 | 10 |
| | 全体 | 2,220,909 | 77,297 | 239 |
| 糖尿病 | 重症度の指標なし | 595,622 | 38,570 | 418 |
| | 全体 | 595,622 | 38,570 | 418 |
| 大腿骨頸部骨折 | 重症度の指標なし | 1,999,406 | 70,600 | 325 |
| | 全体 | 1,999,406 | 70,600 | 325 |
| 胃潰瘍 | 重症度の指標なし | 606,540 | 47,190 | 109 |
| | 全体 | 606,540 | 47,190 | 109 |
| 急性腸炎 | 重症度の指標なし | 244,971 | 37,376 | 590 |
| | 全体 | 244,971 | 37,376 | 590 |

■ 医療費(重症度別)【第2四半期】

H29/02/07

| | | 医療費 | | 症例数 |
|-----------|----------|-----------|---------|------|
| | | 1入院費用(円) | 1日単価(円) | (人) |
| 急性虫垂炎 | 重症度の指標なし | 540,175 | 69,406 | 373 |
| | 全体 | 540,175 | 69,406 | 373 |
| 胆石症 | 重症度の指標なし | 746,196 | 61,324 | 928 |
| | 全体 | 746,196 | 61,324 | 928 |
| 前立腺肥大症 | 重症度の指標なし | 533,049 | 56,748 | 89 |
| | 全体 | 533,049 | 56,748 | 89 |
| 白内障 | 重症度の指標なし | 238,352 | 83,796 | 1215 |
| | 全体 | 238,352 | 83,796 | 1215 |
| 痔核 | 重症度の指標なし | 285,878 | 41,268 | 55 |
| | 全体 | 285,878 | 41,268 | 55 |
| 子宮筋腫 | 重症度の指標なし | 757,329 | 83,261 | 167 |
| | 全体 | 757,329 | 83,261 | 167 |
| 狭心症 | 重症度の指標なし | 654,179 | 151,897 | 1115 |
| | 全体 | 654,179 | 151,897 | 1115 |
| 腎結石及び尿管結石 | 重症度の指標なし | 355,000 | 81,590 | 339 |
| | 全体 | 355,000 | 81,590 | 339 |
| 乳房の悪性新生物 | ステージ0 | 604,377 | 82,415 | 9 |
| | ステージI | 735,936 | 88,642 | 43 |
| | ステージII | 726,334 | 76,012 | 108 |
| | ステージIII | 1,264,341 | 52,198 | 9 |
| | ステージIV | 760,258 | 48,424 | 30 |
| | 不明 | 758,716 | 65,295 | 192 |
| | 全体 | 755,470 | 67,517 | 391 |
| 膝関節症 | 重症度の指標なし | 2,069,225 | 81,816 | 182 |
| | 全体 | 2,069,225 | 81,816 | 182 |
| 鼠径ヘルニア | 重症度の指標なし | 376,233 | 74,845 | 484 |
| | 全体 | 376,233 | 74,845 | 484 |