

■死亡率(重症度別)【第3四半期】

H30/03/05

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	1
	ステージI	1.1	2	185
	ステージII	5.6	3	54
	ステージIII	12.0	3	25
	ステージIV	19.5	25	128
	不明	13.2	31	235
	全体	10.2	64	628
結腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	17
	ステージI	0.0	0	77
	ステージII	0.0	0	94
	ステージIII	3.1	5	162
	ステージIV	10.6	18	170
	不明	7.5	23	305
	全体	5.6	46	825
直腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	13
	ステージI	2.6	1	38
	ステージII	3.5	2	57
	ステージIII	0.0	0	70
	ステージIV	3.9	4	102
	不明	10.2	17	166
	全体	5.4	24	446
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	3
	ステージI	1.4	1	69
	ステージII	5.7	2	35
	ステージIII	6.3	6	95
	ステージIV	15.0	31	206
	不明	12.5	50	400
	全体	11.1	90	808
急性心筋梗塞	Killip I	3.6	4	111
	Killip II	6.4	3	47
	Killip III	29.2	7	24
	Killip IV	54.3	19	35
	不明	40.0	4	10
	全体	16.3	37	227
肺炎	軽症	2.0	8	400
	中等症	10.3	17	165
	重症	13.9	119	855
	不明	0.3	1	393
	全体	8.0	145	1813
喘息	重症度の指標なし	0.0	0	352
	全体	0.0	0	352
脳梗塞	JCS 0-1	1.9	9	469
	JCS 2-3	11.3	15	133
	JCS 10-100	22.1	19	86
	JCS 200-300	41.2	7	17
	不明	N/A	0	0
	全体	7.1	50	705
脳出血	JCS 0-1	2.5	3	120
	JCS 2-3	4.8	3	62
	JCS 10-100	20.6	13	63
	JCS 200-300	66.0	31	47
	不明	N/A	0	0
	全体	17.1	50	292
糖尿病	重症度の指標なし	1.4	6	438
	全体	1.4	6	438
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	0.6	2	359
	全体	0.6	2	359
胃潰瘍	重症度の指標なし	2.0	3	153
	全体	2.0	3	153
急性腸炎	重症度の指標なし	0.4	2	489
	全体	0.4	2	489

■死亡率(重症度別)【第3四半期】

H30/03/05

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.0	0	361
	全体	0.0	0	361
胆石症	重症度の指標なし	0.6	6	934
	全体	0.6	6	934
前立腺肥大症	重症度の指標なし	0.0	0	89
	全体	0.0	0	89
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	1061
	全体	0.0	0	1061
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	61
	全体	0.0	0	61
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	167
	全体	0.0	0	167
狭心症	重症度の指標なし	0.3	3	1130
	全体	0.3	3	1130
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.0	0	315
	全体	0.0	0	315
乳房の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	6
	ステージⅠ	0.0	0	49
	ステージⅡ	0.0	0	84
	ステージⅢ	0.0	0	14
	ステージⅣ	30.4	7	23
	不明	3.5	6	172
	全体	3.7	13	348
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	211
	全体	0.0	0	211
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.0	0	450
	全体	0.0	0	450