

■死亡率(重症度別)【第2四半期】

2020/06/23

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
胃の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	5
	ステージI	0.9	2	229
	ステージII	7.7	3	39
	ステージIII	4.2	2	48
	ステージIV	20.2	23	114
	不明	25.8	67	260
	全体	14.0	97	695
結腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	38
	ステージI	0.0	0	95
	ステージII	0.8	1	124
	ステージIII	2.0	3	147
	ステージIV	11.7	21	179
	不明	12.6	44	350
	全体	7.4	69	933
直腸の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	12
	ステージI	0.0	0	58
	ステージII	4.8	3	63
	ステージIII	0.0	0	93
	ステージIV	7.6	7	92
	不明	13.2	29	219
	全体	7.3	39	537
気管支および肺の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	2
	ステージI	2.2	2	91
	ステージII	3.2	1	31
	ステージIII	7.1	6	84
	ステージIV	19.8	51	258
	不明	20.6	103	500
	全体	16.9	163	966
急性心筋梗塞	Killip I	2.0	3	149
	Killip II	5.1	4	78
	Killip III	22.2	4	18
	Killip IV	44.7	17	38
	不明	26.1	6	23
	全体	11.1	34	307
肺炎	軽症	4.4	25	574
	中等症	7.4	17	231
	重症	12.8	124	965
	不明	0.0	0	203
	全体	8.4	166	1973
喘息	重症度の指標なし	0.0	0	292
	全体	0.0	0	292
脳梗塞	JCS 0-1	2.7	30	1130
	JCS 2-3	4.6	16	349
	JCS 10-100	16.8	23	137
	JCS 200-300	40.0	14	35
	不明	0.0	0	1
	全体	5.0	83	1652
脳出血	JCS 0-1	2.7	7	259
	JCS 2-3	5.5	6	110
	JCS 10-100	7.8	9	116
	JCS 200-300	61.1	44	72
	不明	N/A	0	0
	全体	11.8	66	557
糖尿病	重症度の指標なし	1.5	8	532
	全体	1.5	8	532
大腿骨頸部骨折	重症度の指標なし	2.2	11	489
	全体	2.2	11	489
胃潰瘍	重症度の指標なし	1.8	2	110
	全体	1.8	2	110
急性腸炎	重症度の指標なし	0.2	1	526
	全体	0.2	1	526

■死亡率(重症度別)【第2四半期】

2020/06/23

		死亡率(%)	死亡症例数(人)	症例数(人)
急性虫垂炎	重症度の指標なし	0.2	1	480
	全体	0.2	1	480
胆石症	重症度の指標なし	0.6	7	1087
	全体	0.6	7	1087
前立腺肥大症	重症度の指標なし	0.9	1	108
	全体	0.9	1	108
白内障	重症度の指標なし	0.0	0	1185
	全体	0.0	0	1185
痔核	重症度の指標なし	0.0	0	56
	全体	0.0	0	56
子宮筋腫	重症度の指標なし	0.0	0	208
	全体	0.0	0	208
狭心症	重症度の指標なし	0.3	4	1433
	全体	0.3	4	1433
腎結石及び尿管結石	重症度の指標なし	0.0	0	420
	全体	0.0	0	420
乳房の悪性新生物	ステージ0	0.0	0	13
	ステージI	0.0	0	118
	ステージII	1.0	1	100
	ステージIII	0.0	0	25
	ステージIV	15.6	5	32
	不明	16.2	17	105
	全体	5.9	23	393
膝関節症	重症度の指標なし	0.0	0	358
	全体	0.0	0	358
鼠径ヘルニア	重症度の指標なし	0.2	1	595
	全体	0.2	1	595