

# ■死亡率(重症度別)【年間】

2022/06/16

|               |             | 死亡率(%) | 死亡症例数(人) | 症例数(人) |
|---------------|-------------|--------|----------|--------|
| 胃の悪性新生物       | ステージ0       | 0.0    | 0        | 13     |
|               | ステージI       | 1.2    | 5        | 424    |
|               | ステージII      | 6.7    | 8        | 119    |
|               | ステージIII     | 8.1    | 12       | 148    |
|               | ステージIV      | 16.1   | 51       | 317    |
|               | 不明          | 19.5   | 126      | 645    |
|               | 全体          | 12.1   | 202      | 1666   |
| 結腸の悪性新生物      | ステージ0       | 0.0    | 0        | 52     |
|               | ステージI       | 0.5    | 1        | 222    |
|               | ステージII      | 1.1    | 4        | 353    |
|               | ステージIII     | 1.9    | 7        | 378    |
|               | ステージIV      | 9.0    | 43       | 479    |
|               | 不明          | 13.2   | 123      | 930    |
|               | 全体          | 7.4    | 178      | 2414   |
| 直腸の悪性新生物      | ステージ0       | 0.0    | 0        | 14     |
|               | ステージI       | 0.8    | 1        | 130    |
|               | ステージII      | 3.8    | 6        | 160    |
|               | ステージIII     | 3.9    | 10       | 254    |
|               | ステージIV      | 6.0    | 18       | 299    |
|               | 不明          | 14.2   | 63       | 445    |
|               | 全体          | 7.5    | 98       | 1302   |
| 気管支および肺の悪性新生物 | ステージ0       | 0.0    | 0        | 11     |
|               | ステージI       | 6.3    | 10       | 159    |
|               | ステージII      | 8.1    | 8        | 99     |
|               | ステージIII     | 10.3   | 32       | 312    |
|               | ステージIV      | 18.0   | 117      | 650    |
|               | 不明          | 23.3   | 229      | 984    |
|               | 全体          | 17.9   | 396      | 2215   |
| 急性心筋梗塞        | Killip I    | 4.0    | 19       | 471    |
|               | Killip II   | 4.6    | 11       | 240    |
|               | Killip III  | 14.5   | 8        | 55     |
|               | Killip IV   | 49.1   | 56       | 114    |
|               | 不明          | 35.0   | 14       | 40     |
|               | 全体          | 11.7   | 108      | 923    |
| 肺炎            | 軽症          | 8.3    | 67       | 812    |
|               | 中等症         | 12.1   | 47       | 387    |
|               | 重症          | 21.3   | 353      | 1656   |
|               | 不明          | 6.0    | 5        | 84     |
|               | 全体          | 16.1   | 472      | 2939   |
| 喘息            | 重症度の指標なし    | 0.8    | 2        | 249    |
|               | 全体          | 0.8    | 2        | 249    |
| 脳梗塞           | JCS 0-1     | 2.1    | 78       | 3709   |
|               | JCS 2-3     | 7.3    | 89       | 1213   |
|               | JCS 10-100  | 21.6   | 87       | 403    |
|               | JCS 200-300 | 48.0   | 48       | 100    |
|               | 不明          | N/A    | 0        | 0      |
|               | 全体          | 5.6    | 302      | 5425   |
| 脳出血           | JCS 0-1     | 4.7    | 43       | 915    |
|               | JCS 2-3     | 8.7    | 34       | 389    |
|               | JCS 10-100  | 14.0   | 48       | 342    |
|               | JCS 200-300 | 60.9   | 156      | 256    |
|               | 不明          | N/A    | 0        | 0      |
|               | 全体          | 14.8   | 281      | 1902   |
| 糖尿病           | 重症度の指標なし    | 1.2    | 14       | 1141   |
|               | 全体          | 1.2    | 14       | 1141   |
| 大腿骨頸部骨折       | 重症度の指標なし    | 2.1    | 32       | 1520   |
|               | 全体          | 2.1    | 32       | 1520   |
| 胃潰瘍           | 重症度の指標なし    | 2.2    | 7        | 325    |
|               | 全体          | 2.2    | 7        | 325    |
| 急性腸炎          | 重症度の指標なし    | 0.5    | 5        | 949    |
|               | 全体          | 0.5    | 5        | 949    |

# ■ 死亡率(重症度別)【年間】

2022/06/16

|           |          | 死亡率(%) | 死亡症例数(人) | 症例数(人) |
|-----------|----------|--------|----------|--------|
| 急性虫垂炎     | 重症度の指標なし | 0.0    | 0        | 1160   |
|           | 全体       | 0.0    | 0        | 1160   |
| 胆石症       | 重症度の指標なし | 0.5    | 14       | 2997   |
|           | 全体       | 0.5    | 14       | 2997   |
| 前立腺肥大症    | 重症度の指標なし | 0.2    | 1        | 412    |
|           | 全体       | 0.2    | 1        | 412    |
| 白内障       | 重症度の指標なし | 0.0    | 0        | 2086   |
|           | 全体       | 0.0    | 0        | 2086   |
| 痔核        | 重症度の指標なし | 0.0    | 0        | 324    |
|           | 全体       | 0.0    | 0        | 324    |
| 子宮筋腫      | 重症度の指標なし | 0.0    | 0        | 576    |
|           | 全体       | 0.0    | 0        | 576    |
| 狭心症       | 重症度の指標なし | 0.3    | 9        | 3371   |
|           | 全体       | 0.3    | 9        | 3371   |
| 腎結石及び尿管結石 | 重症度の指標なし | 0.1    | 1        | 1362   |
|           | 全体       | 0.1    | 1        | 1362   |
| 乳房の悪性新生物  | ステージ0    | 0.0    | 0        | 37     |
|           | ステージI    | 0.0    | 0        | 312    |
|           | ステージII   | 0.3    | 1        | 340    |
|           | ステージIII  | 1.2    | 1        | 82     |
|           | ステージIV   | 11.5   | 6        | 52     |
|           | 不明       | 14.3   | 37       | 259    |
|           | 全体       | 4.2    | 45       | 1082   |
| 膝関節症      | 重症度の指標なし | 0.1    | 1        | 706    |
|           | 全体       | 0.1    | 1        | 706    |
| 鼠径ヘルニア    | 重症度の指標なし | 0.1    | 1        | 1643   |
|           | 全体       | 0.1    | 1        | 1643   |